



BURGOS 2018

21 CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO

Del 3 al 5 de octubre · Fórum Evolución



ESTUDIO SOBRE DISPENSACIÓN DE IBP (INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES) EN OFICINAS DE FARMACIA DE CUENCA Y SORIA

Autores: Castro Corada, F¹; Martínez Sánchez, J.M²; Lillo Serrano, A.J³

1. Introducción

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se encuentran entre los fármacos más prescritos y utilizados por la población en nuestro medio, y su consumo sigue aumentando en España siendo el omeprazol el fármaco más prescrito .


Están indicados principalmente en las enfermedades relacionadas con la secreción gástrica , donde han demostrado ser más eficaces que otros antiulcerosos.

Se estima que en España una de cada 10 personas toma un IBP diariamente, cifra que se encuentra por encima de la de otros países europeos .


En general, se considera que los IBP son fármacos seguros, aunque no están exentos de riesgos, sobre todo en su utilización a largo plazo; se han descrito fracturas osteoporóticas, infecciones entéricas, hipomagnesemia o déficit de hierro y vitamina B12 asociados a su consumo, entre otros.

Resulta, por ello, relevante replantearse si la elevada exposición poblacional a estos fármacos se ajusta a una prescripción prudente y basada en la evidencia.

4. Resultados



pacientes totales 674




2. Objetivo

Analizar el consumo de IBP en oficinas de farmacia de la provincia de Cuenca y Soria.

3. Material y Método

Recogida de datos de los distintos tipos de IBP dispensados en oficinas de farmacia de la provincia de Cuenca y Soria desde el 14 febrero de 2018 al 15 junio de 2018.



5. Conclusiones

Existe un uso desmesurado de los IBP , tanto en patologías para los que no están indicados, como asociados a otros medicamentos de forma errónea.

El Omeprazol es con mucho el IBP más dispensado y consumido, su uso e indicación correcta es desconocida por la mayoría de pacientes.

Muchas veces es prescrito de manera innecesaria cuando no existe un verdadero riesgo a nivel gástrico.

La oficina de farmacia es el lugar adecuado para descubrir estos abusos e indicar los usos correctos .