



BURGOS 2018

21 CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO

Del 3 al 5 de octubre · Fórum Evolución



CONSUMO DE PSICÓTROPICOS EN UNA FARMACIA COMUNITARIA A LO LARGO DE 2017

Introducción

El incremento del consumo de psicótrópicos a lo largo de los últimos años y el riesgo para la salud pública que ello conlleva, pone de manifiesto la necesidad de implantar medidas desde los diferentes ámbitos sanitarios. En este sentido, la proximidad y accesibilidad de la farmacia comunitaria la convierte en una pieza clave para garantizar el control y supervisión de la farmacoterapia. Con el fin de planificar las medidas que permitan llevar a cabo una adecuada atención farmacéutica en el ámbito de los psicótrópicos desde una farmacia comunitaria, es necesario conocer los subgrupos terapéuticos dispensados y detectar los medicamentos de mayor consumo y relevancia.

Objetivos




General: Analizar las dispensaciones de medicamentos psicótrópicos en la población atendida en una farmacia comunitaria.
Específicos: Conocer cuáles son los subgrupos terapéuticos y los fármacos más dispensados.
Averiguar si existen variaciones estacionales en los patrones de consumo.

Material y Método

Tipo de estudio: observacional, descriptivo y retrospectivo.
Sujeto de estudio y periodo de análisis: dispensaciones de psicótrópicos realizadas a lo largo de 2017.
Criterios de inclusión: Que el medicamento dispensado tenga la calificación legal de psicótrópicos.
Datos analizados: número de dispensaciones realizadas y fechas de dispensación.
Herramientas utilizadas:
•Para la obtención de los datos: Bot Plus y AGF Farmatic
•Para el procesado de los datos: Microsoft Excel.

Resultados

Los psicótrópicos han supuesto el 7% de las dispensaciones totales



F. farmacéutica	LORAZEPAM			
	comprimidos			
Dosis	1 mg	2 mg	5 mg	
Nº unidades	25	50	30	20
Nº dispensaciones	509	3091	97	513

F. farmacéutica	LORMETAZEPAM		
	comprimidos	gotas orales	
Dosis	1 mg	2 mg	2,5 mg/mL
Nº unidades	30	20	20 mL
Nº dispensaciones	981	1470	20



Conclusiones

- El elevado consumo de benzodiazepinas en la población atendida coincide con los datos de otros estudios que indican que existe una prescripción excesiva de este tipo de fármacos.
- Basándose en estos resultados es evidente que las intervenciones a realizar deben centrarse en este grupo de fármacos y que es necesario implicar también en ellas a los prescriptores para reconducir la situación en la población sujeta al ámbito de actuación de esta farmacia.
- Estas actuaciones son especialmente relevantes en los grupos poblacionales más susceptibles de presentar Resultados Negativos de la Medicación (polimedicados, personas mayores, pacientes con problemas hepáticos...).

Autores

Natalia Turrado Mendoza, Ana Belén Correa Redondo, María Ángeles Solinis Aspiazu

