



BURGOS 2018

21 CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO

Del 3 al 5 de octubre · Fórum Evolución



CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS EN OFICINAS DE FARMACIA DE CUENCA Y SORIA

Autores: Castro Corada ,F¹; Martínez Sánchez ,J.M² ; Lillo Serrano, A.J³

1. Introducción

Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera la depresión como principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave.

Su prevalencia se estima entre el 3 y el 5%, afectando a 800.000 personas Anualmente en España, situándose como la segunda causa de muerte en personas de edades comprendidas entre 15 y 29 años .

A lo largo de la vida puede afectar a un 10-20% de la población adulta, su riesgo es 2 -3 veces mayor en mujeres (14,4%) que en hombres(6,29%) y el 75-80% son recidivantes .

En la población geriátrica, en particular, los estudios epidemiológicos indican que su prevalencia no solo es elevada conllevando a una alta morbilidad, sino que además varía según el grupo poblacional al que se estudie.

España es el décimo consumidor de antidepresivos a nivel mundial y su consumo se ha triplicado desde al año 2000.




2. Objetivos

Detectar el consumo de antidepresivos dispensados mediante prescripción médica en oficinas de farmacia de la provincia de Cuenca y Soria.

3. Material y método.

Recogida de datos de los principios activos dispensados en oficina de farmacia según porcentaje.. Estudios realizados del 11 de febrero de 2018 al 14 de junio de 2018

4. Resultados



5. Conclusiones

En los últimos años se ha producido un aumento en el consumo de antidepresivos, la población del medio rural está seriamente envejecida, los ancianos acumulan gran parte de las dispensaciones de antidepresivos.

La dispensación de antidepresivos a otros grupos de población es mucho menor.

La oficina de farmacia es un lugar idóneo para detectar las variaciones en su consumo.